



ПРАЙС-ЛИСТ

*Человеческая жизнь бесценна.
Давайте беречь себя и своих близких!*



БРЕЙМАКС

Магний 50 мг, Витамин B6 1мг, Инозитол 125мг
Глицин 100мг, L-глутамин 100мг



Капсула №30

Показания:

Для улучшений памяти и внимания. При повышенных психоэмоциональных и умственных перегрузках

Режим

дозирования:

По 1 капсуле 1-2 раза в день. Длительность курса: 1 - 3 месяца.

ВИТАХЕЛ

Цинк пиколинат 15 мг, мед 1500 мкг в соотношении 10:1



Капсулы №60

Показания:

Поддержка иммунитета, Атеросклероз; Поддержание здоровья волос, ногтей, костей и зрения. Профилактика репродуктивных заболеваний, Профилактика метаболических - восстановление после травм, и когнитивных нарушений.

Режим

дозирования:

Рекомендуется принимать по 1 капсуле в день для лиц от 11 лет и старше. При беременности и лактации по 1-2 капсулы.

КАРНИФИТ

L-Карнитин - 1 г (200 мг в 1 мл)



Ампулы №5 по 5 мл
каждая ампула

Показания:

Метаболик, антиоксидант, антигипоксикант, нейтропротектор: ИБС ХСН атеросклероз, инсульт ишемический, неврит, диабет, олигоспермия, гипоксия.

Режим

дозирования:

Препарат вводится в/в или в/м по 1-3 г в сутки.

КЕТОСИД

Декскетопрофен 25; Тиоколхикозид 4-8мг



Таблетки № 14\20

Показания:

Показан для симптоматического лечения остеоартроза, болевых синдромов позвоночника, внесуставного ревматизма, болезненных мышечных спазмов, посттравматических и послеоперационных болей.

Режим

дозирования 25/4: составляет одну таблетку 2-3 раза в сутки. Курс лечения 5-7 дней.

Режим

дозирования 25/8: составляет одну таблетку 1-2 раза в сутки. Курс лечения 5-7 дней.

ЛИНОЦЕТИН

Цитиколин – 500 мг



Гель - стик для приема
внутри №10 по 10 мл.

Показания:

Оказывая ноотропное действие улучшает когнитивные функции (память, внимание, концентрацию), поддерживает структуру и питание клеток мозга, улучшает нервную передачу в центральном отделе. Профилактика при Альцгеймере и деменции, цереброваскулярные нарушения, ЧМТ, старческий период, инсульт.

Режим

дозирования: По 1 пакету 1-2 раза в день

МЕТОКСИПИН

Метилэтилпиридинола гидрохлорид 7,5мг



Раствор для инфузии
100мл №1

Показания:

Острый инфаркт миокарда; Нестабильная стенокардия; Ишемический инсульт; Нарушения мозгового кровообращения; Черепно-мозговая травма

Режим дозирования:

Внутривенно капельно суточно по 5-10 мг/кг в течение 10-12 дней. Вводят со скоростью 20-30 капель в минуту. В кардиологии в/в (20-40 капель в минуту) 120-180 мл (600-900 мг) 1-3 раза в сутки в течение 5-15 дней с последующим переходом на внутримышечное введение.

МОРЕСЕРК

Бетагистин дигидрохлорид 24мг



Таблетки №30

Показания:
Вестибулярные головокружения различного генеза

Режим дозирования:
Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день. Курс лечения определяется индивидуально

НЕРВАК

Ипидакрин - 5 мг



№5 по 5 мг /1 мл
каждая ампула

Показания:
Улучшает проводимость в нервно- мышечной системе, восстанавливая связь между мозгом и телом. Нейромышечные расстройства при диабете,инсульте,нейропатиях, острых нарушениях мозгового кровообращения,невриты, невралгии,чмп, остеохондроз, миастения аутоиммунное заболевание

Режим дозирования:
По 5 мг (1 ампула) 1-2 раза в день в/м или п/к. Курс лечения 10-15 дней

НЕРВАК ФОРТ

Ипидакрин - 15 мг



№10 по 15 мг /1 мл
каждая ампула.

Показания:
Улучшает проводимость в нервно- мышечной системе, восстанавливая связь между мозгом и телом. Нейромышечные расстройства при диабете,инсульте,нейропатиях, острых нарушениях мозгового кровообращения,невриты, невралгии,чмп, остеохондроз, миастения аутоиммунное заболевание .

Режим дозирования:
По 15 мг (1 ампула) 1-3 раза в день в/м или п/к. Курс лечения 10-15 дней

ПАРАСТАМИК



Порошок для приготовления раствора для инъекций, флакон №1

Показания:

Пептические язвы желудка и 12-ти перстной кишки; Профилактика и лечение стрессовых язв

Режим

дозирования:

Вводят в/в в 10 или 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида

ПРОМОВИА 40 мг/2 мл Натриевой соли сшитой Гиалуроновой кислоты 2% гель



40 мг 2 мл
Готового шприца

Показания:

В травматологии и ревматологии остеоартрит, остеоартроз.
В гинекологии после гистероскопии, менопауза (сухость влагалища), косметическая гинекология, опущение матки и недержание мочи.
В Косметологии биоревитализация, контурная пластика и т.д.

Режим дозирования:

ПРОмовиа 40мг рекомендуемая доза 3 инъекции (1 инъекция в неделю с перерывами через неделю).
Рекомендуется 2 цикла терапии в год (на основании лечащего врача и общего состояния пациента) интервал между циклами не должен составлять менее 6 месяцев.

РИБАТРАН

Трипсин – 4,2 микрокатал; Панкреатическая рибонуклеаза – 0,33 микрокатал; Химотрипсинаген – 93,4 микрокатал



Таблетки №20

Показания:

При повреждении костей, суставов и мягких тканей; Профилактика послеоперационных осложнений, Суставной синдром, Острые поверхностные тромбофлебиты, Посттромботический синдром, Васкулит, Облитерирующий тромбангиит, Атеросклероз артерий нижних конечностей, Лимфатический отёк, Диабетическая ангиопатия и ретинопатия, Увеит, Иридоциклит, Гемофтальм, Аутоиммунный тиреоидит, Рассеянный склероз; Острые и хронические воспалительные процессы верхних и нижних дыхательных путей и мочеполовой системы.

Режим

дозирования:

По 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения назначается в зависимости от формы и тяжести заболевания.

ТОНИФЕР

На 5 мл (1 чайную ложку) сиропа: Цитрат железа аммония 200 мг (эквивалентно: 40 мг), Фолиевая кислота (0.5 мг), Витамин B12 (5 мкг)



Сироп 200 мл

Показания:

Лечение анемии легкой, средней или тяжелой степени, требующей заместительной терапии.

Режим дозирования:

Сироп принимают внутрь, вне зависимости от приема пищи. Расчет дозы ведется с учетом того, что в каждом 5 мл сиропа содержится 40 мг железа. В лечебных целях: Взрослые и дети >30 кг: от 100 до 200 мг железа в день, разделенные на 2 приема.

Дети от 20 до 30 кг: от 100 до 150 мг железа в день, разделенные на 2 приема. Дети <20 кг в зависимости от веса: от 3 до 6 мг железа / кг / день, разделенных на 2 приема. В

профилактических целях: Взрослые: 60 мг железа в день, разделенные на 2 приема.

ФОРТЕКС

Комплекс для суставов и костей



Гель саше №20 по 5 г.

Показания:

Остеоартрит, поддержка костной и хрящевой ткани, комплексная поддержка при остеопорозе

Режим

дозирования:

1 саше растворить в 150-200 мл воды. 1-2 раза в сутки. Курс лечения 1-2 месяца

ФОРТИГЕН

На 5 мл (1 чайную ложку) сиропа: Ципрогептадин 2,0 мг, Гидрохлорид тиамина (витамин B1) 1,0 мг, Рибофлавин (витамин B2) 0,5 мг, Пиридоксин (витамин B6) 0,5 мг, Никотинамид (витамин B3) 10,0 мг, Цианокобаламин (витамин B12) 1,0 мкг.



Сироп 120 мл

Показания:

Комплексный препарат центрального действия, способствующий стимуляции аппетита и улучшению массы тела при недоедании, обеспечивая оптимальное усвоение сахаров и белков.

Режим дозирования:

Дети: от 2 до 6 лет: от 1/2 (2,5 мл) до 1 чайной ложки (5 мл) два или три раза в день. от 7 до 14 лет: 2 чайные ложки (10 мл) два или три раза в день. Подросткам и взрослым: 2 чайные ложки (10 мл) 3 раза в день или по назначению врача. Плотнo закрывайте крышку сразу после каждого использования.

ЙОДОХЕЛ

Липосомальный Йод 150 мкг в 1 капле



**Капли для приема
внутри 25 мл №1**

Показания:

Профилактика лечения йододефицитных заболеваний у взрослых и детей старше 11 лет, у беременных и в период лактации

Режим дозирования:

йододефицитные заболевания - 150 мкг - 1 капля
Беременность и лактация - 300 мкг - 2 капли
взрослые и дети старше 11 лет - 150 мкг - 1 капля

СУРОЛ

Урсодезоксихолевая кислота 250мг, 500 мг



Таблетки №100

Показания:

Неосложненная желчнокаменная болезнь: растворение холестериновых желчных камней при функционирующем желчном пузыре; профилактика рецидивов камнеобразования после холецистэктомии, хронические гепатиты различного генеза, холестатические заболевания печени различного генеза, первичный билиарный цирроз (при отсутствии признаков декомпенсации), первичный склерозирующий холангит, кистозный фиброз (муковисцидоз); неалкогольная жировая болезнь печени, неалкогольный стеатогепатит, алкогольная болезнь печени, хронические вирусные гепатиты, дискинезии желчевыводящих путей, билиарный рефлюкс-гастрит, рефлюкс-эзофагит.

Режим дозирования:
Вечером, по 10 мг/кг в течение 3 мес

ГИНЕЛЛА

В комплексе с инозитолом и гиалуроновой кислотой



**6 одноразовых
аппликаторов
по 5мл для вагинального
применения**

Показания:

Нормализует pH до 4-5. Слишком низкий pH губителен для сперматозоидов
Улучшает микрофлору
Защищает сперматозоиды от повреждений
Стимулирует подвижность сперматозоидов
Устраняет сухость - в составе есть гиалуронка.
Используется при антибиотикотерапии, антибиотики губно влияют на микрофлору и pH.
Планирование беременности - ЭКО-центры, менопауза, климактерический период, после лечения с антибиотиками, после косметической процедуры в гинекологии, ХГЧ

Режим дозирования:

1 аппликатор (5 мл) во влагалище 1 раз в день
Применять за 10-15 минут до полового акта
Рекомендуется в дни, благоприятные для зачатия

ГИНЕФЕРОН

Крем-гель для интравагинального применения



**Акридонуксусная
кислота 50,0 мг.**

Показания:

Для локальной поддержки иммунной защиты слизистой. Герпетические поражения, вирусно-воспалительные состояния, после процедур, рецидивной дискомфорт.

Режим

дозирования:

1 гель шприц 1 раз в день интравагинально. Курс лечения 5-10 дней.

ГИНОБАЛАНС

Инозитол 2000 мг, метилфолат 800 мкг, витамин Б6 5000 мкг, магний бисглицинат 150 мг.



**Под ним саше гель для
приема внутрь 30 саше,
по 10 мл**

Показания:

Метаболический дисбаланс, планирование беременности, СПКЯ, овариальная функция, нарушение цикла.

Режим

дозирования:

1 саше 1-2 раза в день. Курс лечения 1-2 месяца

КЕТОКЛИН

Кетоконазол 400 мг, клиндамицин 100 мг



**Суппозитории
вагинальные №7**

Показания:

Вагиниты любой этиологии, Бактериальный вагиноз, Молочница, Смешанные инфекции, Трихомониаз. Не вытекает и не пачкает белье, т.к. в состав входит водорастворимый полиэтиленоксид, который попадая на слизистую образует гелевую массу.

Режим

дозирования:

Применяется 1 свеча на ночь. После введения 10-15 минут покой, Курс лечения 7 дней.

КОЛПОЦИН-Т Метронидазол 500мг



**Раствор для инфузии
100мл**

Показания:

Протозойные инфекции; Амебиаз; Трихомониаз; Трихомонадный вагинит; Трихомонадный уретрит; Инфекции костей и суставов; Инфекции ЦНС (менингит, абсцесс мозга); Бактериальный эндокардит; Пневмония; Эмпиема; Абсцесс легких; Сепсис; Инфекции, вызывающие перитонит; Абсцесс печени; Инфекции органов малого таза; Псевдомембранозный колит; Гастрит или язва двенадцатиперстной кишки; Профилактика послеоперационных осложнений.

Режим дозирования:

Взрослым и детям старше 12 лет в начальной дозе 0,5-1 г в/в капельно (длительность инфузии 30-40 мин) затем каждые 8ч по 500 мг со скоростью 5 мл/мин. Максимальная суточная доза - 4 г. Детям в возрасте до 12 лет по той же схеме в разовой дозе 7,5 мг/кг.

ЛАКТОХЕЛ

Молочная кислота 25 мг, Полезные бактерии 200 мкг, Бисабоол 1 мг.



**Под ним спринцовка для
вагинального применения
№3 по 100 мл .**

Показания:

Гигиеническое средство для нормализации микрофлоры, pH, и дискомфорта, антибиотикотерапия

Режим

дозирования:

1 спринцовка 1 раза в день. Курс лечения 1-2 упаковки

ЛЕМОКСОЛ

Цефтазидим пентагидрат 1,0 гр



Флакон 1гр №1

Показания:

Инфекционно-воспалительные заболевания: тяжелые инфекции (септицемия, бактериемия, перитонит, менингит, инфекции у пациентов со сниженным иммунитетом, инфицированные ожоги)

Режим

дозирования:

Взрослые и дети старше 12 лет: 1-2 г 2 раза в сутки в/в или в/м. Дети 1 мес. до 12 лет 50-100 мг/кг 2-3 раза в сут. в/в или в/м

ФЕМИНАК

Мирамистин 100 мкг, Экстракт ромашки 250 мкг,
Экстракт алоэ вера 1000 мкг



**Одноразовые спринцовки
для вагинального
применения №5 по 100 мл**

Показания:

Вагинальное
антисептическое средство
для санации, регенерации,
увлажнения,
противовоспалительного
эффекта.

Режим


дозирования:

1 спринцовка 1
раза в день. Курс
лечения 5-10 дней

Суrol

Урсодезоксихолевая кислота 500 мг
Таблетка №100

ЭФФЕКТ
проверенный
годами




Рибатран

Трипсин

Химотрипсинаген

Панкреатическая рибонуклеаза



Надежный попутчик по дороге к
ЗДОРОВЬЮ

Лемоксол

цефтазида пентагидрат 1.0

Уверенность в победе



YODOHEL

Йод 150 мкг/1 капле 25 мл

Капли для приема внутрь

500 капель во флаконе

**YODOHEL- рациональный
выбор для восполнения йода**

**В одной капле
море здоровья!**



ГИНОБАЛАНС

Гель для приема внутрь

Формула женского баланса

Поддержка женского метаболического и репродуктивного баланса

Мино-инозитол

D-хиро-инозитол

Mg Магния бисглицинат

B₆ Витамин B6

Метилфолат



30 саше-стиков по 10 мл

ФЕМИНАК

РАСТВОР ДЛЯ ВАГИНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Мирамистин
Экстракт ромашки
Экстракт алоэ вера

ДЕЛИКАТНЫЙ УХОД
КОМФОРТ И ЗАЩИТА
КЛИНИЧЕСКИ ОБОСНОВАНО

Что такое Феминак?
Феминак — раствор для вагинального применения, предназначенный для поддержания естественного баланса микрофлоры у женщин.

Поддерживает микрофлору
Сохраняет естественное увлажнение

Поддерживает защитный барьер
Удобное одноразовое применение



ГИНЕФЕРОН

Акридонуксусная кислота — 50,0 мг
N-метилглюкамин (меглюмин) — 38,5 мг

Крем-гель для интравагинального применения

Поддержка естественной защиты слизистой

- Поддержка естественной защиты слизистой интимной зоны
- Локальное применение
- Комфортный формат



Одноразовый шприц-аппликатор
5 мл №95

Лактохел

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МИКРОФЛОРЫ

Молочная кислота
Смесь IntimioBlend
α-бисаболол
Натрия кокамфоацетат

Раствор для вагинального применения

Поддерживает микрофлору
Сохраняет естественное увлажнение
Поддерживает защитный барьер
Удобное одноразовое применение

